



CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

## OFTALPET



### 1. CLASIFICACIÓN

Antibacteriano - Antiinflamatorio

### 2. FORMA FARMACÉUTICA

Oftálmica y Ótica

### 3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada mL contiene:

Gentamicina base (como sulfato).....	3 mg
Dexametasona sodio fosfato .....	1 mg
Lidocacina HCl .....	5 mg
Excipientes c.s.p. ....	1mL

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Caninos y felinos.

### 5. INDICACIONES DE USO

**OFTALPET**, está indicado en perros y gatos para el tratamiento de afecciones de ojos y oídos como, Blefaritis (inflamación de los párpados), conjuntivitis, queratitis (inflamación de la córnea) y otitis externa en donde estén involucrados gérmenes sensibles de la gentamicina.

**Agentes etiológicos susceptibles:** Klebsiella spp.; Pseudomona sp; Proteus sp.; Escherichia coli; Staphylococcus sp.; Streptococcus sp. Pasteurella multocida.

### 6. VÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

**Vía oftálmica:** Instilar 1 gota por cada ojo dentro del saco conjuntival.

**Vía ótica:** De 2 a 4 gotas por oído, aplicar en el canal auditivo previa limpieza de la oreja.

### 7. DURACIÓN MÁXIMA DE USO DESPUÉS DE SU RECONSTITUCIÓN O PREPARACIÓN.

Vía oftálmica: 7 días o a criterio del médico veterinario.

Vía ótica: 7 días o a criterio del médico veterinario





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

## 8. DURACIÓN MÁXIMA DE USO DESPUÉS DE SU RECONSTITUCIÓN O PREPARACIÓN.

Vía oftálmica: 7 días o a criterio del médico veterinario.

Vía ótica: 7 días o a criterio del médico veterinario

## 9. DOSIFICACIÓN:

Vía oftálmica: Cada 6-8 horas.

Vía ótica: Cada 6 -8 horas

## 10. MARGEN DE SEGURIDAD

No corresponde

## 11. PERIODO DE RETIRO

No aplica

## 12. CONTRAINDICACIONES

- Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. Existe casos de reacciones alérgicas cruzadas entre los distintos aminoglucósidos, tener en cuenta si hay hipersensibilidad a algún otro antibiótico aminoglucósido.
- Tener cautela en pacientes neonatos, geriátricos, con enfermedad renal preexistente.
- Examinar el canal ótico externo minuciosamente para comprobar que la membrana timpánica no tenga ninguna solución de continuidad con el fin de evitar la posibilidad de transmitir cualquier infección al oído medio.
- No utilizar en conjunto con drogas que puedan inducir ototoxicidad.
- No administrar durante la preñez y lactancia.

## 13. PRECAUCIONES DE USO

- El uso de gentamicina puede favorecer el crecimiento de organismos no susceptibles, incluidos hongos. Si se desarrolla hipersensibilidad, el tratamiento debe discontinuarse y se debe aplicar una terapia apropiada.
- Tener cautela en su uso en perros de "trabajo"
- No utilizar en pacientes que presenten perforación timpánica.
- El uso constante de Dexametasona puede inducir supresión de la glándula suprarrenal.
- No aplicar en caso de úlceras corneales, glaucomas, enfermedades virales que afecten al ojo y afecciones causadas por hongo.
- El uso prolongado de corticoesteroides tópicos puede causar incremento en la presión intraocular en pacientes susceptibles.
- No utilizar en casos de infecciones por gérmenes resistentes a la gentamicina.





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

## 14. CONSERVACIÓN

El producto se almacenará dentro de un rango de temperatura de 15 – 30 °C, en lugar seco y protegido del sol. Mantener fuera del alcance de los niños.

## 15. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco de polietileno de alta densidad X 10 ml.

## 16. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Producto de Venta Libre.

## 17. AUTORIZACIÓN SANITARIA

Reg. SENASA N°: F.F6.37.N.0064

