



CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

REAMIZONA FORTE POLVO



1. CLASIFICACIÓN
ANTIBIOTICO - ANTIINFLAMATORIO
2. FORMA FARMACÉUTICA
POLVO SOLUBLE
3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA


Cada 100 g. contiene:

Oxitetraciclina10.00 g.
Dexametasona25.00 mg.
Excipientes c.s.p.....100.00 g.

4. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

REAMIZONAFORTE, es un antibiótico de amplio espectro asociado con un potente antiinflamatorio que está indicado en el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias gran positivas y negativas, en terneros; neumonías, diarreas, enteritis inespecíficas e infecciones frecuentes producidos por agentes susceptibles y; en corderos y lechones; neumonía, enteritis bacilar, diarreas e infecciones del ombligo de los recién nacidos productos por agentes susceptibles.

Producto indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias asociadas a microorganismos sensibles a la oxitetraciclina como *Histophilus somni*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma bovis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus parasuis*; infecciones genitales asociadas a cepas de *Arcanobacterium pyogenes* *Chlamydia abortus*, *Arcanobacterium pyogenes* e infecciones podales asociadas a cepas de *Dichelobacter nodosus*, *Fusobacterium necrophorum*, *Prevotella melaninogenica*, también infecciones causadas por *Leptospira* spp. En cerdos además está indicado para Síndrome MMA (metritis-mastitis-agalaxia) asociada a cepas de *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *E. coli* y *Klebsiella* y metritis asociadas a cepas de *Arcanobacterium pyogenes*.





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

5. ESPECIES DE DESTINO

Bovinos, Ovinos, Porcinos.

6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No usar en casos de hipersensibilidad conocida sobre los principios activos.
- No utilizar en caso de resistencia conocida a las tetraciclinas.
- No utilizar en animales con el rumen funcional
- No utilizar en animales con alteraciones hepáticas o renales, diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca, hiperadrenocorticismos u osteoporosis.
- No usar en infecciones víricas o en caso de infecciones micóticas sistémicas.
- No usar en animales con úlceras gastrointestinales o con demodicosis.
- No administrar en equinos

7. DOSIFICACIÓN

Administrar en agua de bebida y/o alimento 1 g REAMIZONA FORTE/ 4.54 Kg peso vivo durante 3 a 5 días.

- Bovinos (terneros), ovinos (corderos) y porcinos (lechones)
- O a criterio de su profesional de confianza.

8. PERIODO DE RETIRO


Carne: 21 días

9. VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

3 años

10. PRECAUCIONES ESPÉCIALES DE CONSERVACIÓN

- Guardar bajo techo, protegiéndolo del sol.
- Conservar el producto en su envase herméticamente cerrado.
- Almacenar a temperatura ambiente, no más de 30°C.
- No transportar junto con alimentos o bebidas.
- **Mantener fuera del alcance de los niños.**





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

11. NATURALEZA DEL ENVASE

Sobre: Palupol Papel - Aluminio - Polietileno

Sobre: Trilaminado PET – ALU - PE

12. PRESENTACIONES

Sobre x 10 g.

Sobre x 20 g.

Sobre x 50 g.

Sobre x 100 g.

Sobre x 200 g.

Sobre x 1 Kg.

13. REGISTRO SENASA:

F.100.070.N.00032

14. TITULAR

Representaciones Agropecuarias Nacionales EIRL

