



CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

ECTOLOM GOLD



Composición Cualitativa y Cuantitativa:

Cada 100 mL de producto contiene:

Principios activos:

Fipronil.....250 mg
Piriproxifeno.....250 mg
Excipientes c.s.p.....100 mL

**Forma
Farmacéutica:** SOLUCION TOPICA

DATOS CLINICOS

INDICACIONES:

ECTOLOM GOLD, antiparasitario externo de uso tópico que proporciona un control efectivo pulgas, garrapatas, piojos y sarna sarcóptica. Asocia efectivamente un adulticida con un regulador del crecimiento de las pulgas. Es eficaz contra pulgas adultas hasta por 90 días e inhibe el desarrollo de huevos y larvas fértiles hasta por 120 días.

Agentes etiológicos susceptibles

B. microplus, D. hominis, H. irritans, B. bovis, L. vituli, C. Hominivorax Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Pulex irritans, Echinophaga gallinácea, Rhipicephalus sanguineus, Felicola subrostratus.

Especies de destino: caninos, felinos, cuyes y aves

Vía de administración:

Vía tópica.
Aplicar el producto sobre la piel del animal a contrapelo.
Si fuera el caso, levantar el pelo del animal para que el producto ingrese hasta la piel

Contraindicaciones:

No utilizar en cachorros ni gatitos menores de 8 semanas.
No utilizar en especies no indicadas.
No utilizar durante el primer trimestre de gestación
No utilizar en animales con hipersensibilidad al fipronil o al piriproxifeno.





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

Dosificación:

Perros: 3 a 6 mL por Kg de peso vivo (2 - 4 pulverizaciones / Kg de peso vivo), dependiendo del tamaño del pelo.

Gatos: 3 mL por Kg de peso vivo. (2 pulverizaciones / Kg de peso vivo)

Intervalo y Duración del tratamiento:

Según criterio del médico veterinario.

Precauciones:

No bañar a los animales dentro de las 48 horas anteriores o posteriores de la aplicación del producto.

Los síntomas de intoxicación no son específicos pero pueden ocurrir manifestaciones neurológicas como excitación, temblores o sedación excesiva.

No existe antídoto específico.

Aplicar tratamiento sintomático.

Tener precaución en animales debilitados, gerontes, gestantes o lactantes.

En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico.

Producto moderadamente tóxico.

Condiciones de almacenamiento:

El producto se almacenará dentro de un rango de temperatura de 15– 30 °C, en lugar seco y protegido del sol.

Mantener alejado del alcance de los niños.

Tóxico para los peces

PERIODO DE VIDA UTIL DEL PRODUCTO:

02 años

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACION:

Guardar bajo techo, protegiéndolo del sol. Conservar el producto en su envase herméticamente cerrado. Almacenar a temperatura ambiente, no más de 30°C. No transportar junto con alimentos o bebidas. Mantener fuera del alcance de los niños.

NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE:

ENVASE: El producto se presenta en frascos de (PBD) polietileno de baja densidad, color blanco, como envase primario y como empaque secundario en caja de cartón





CALIDAD EN MEDICINA VETERINARIA

Presentación del producto terminado:

- Frasco de polietileno de baja densidad (PBD) X 10 mL.
- Frasco de polietileno de baja densidad (PBD) X 30 mL.
- Frasco de polietileno de baja densidad (PBD) X 60 mL.
- Frasco de polietileno de baja densidad (PBD) X 100 mL.
- Frasco de polietileno de baja densidad (PBD) X 120 mL.
- Frasco de polietileno de baja densidad (PBD) X 250 mL.
- Frasco de polietileno de baja densidad (PBD) X 500 mL.
- Frasco de polietileno de baja densidad (PBD) X 1000 mL.
- Galonera de polietileno de baja densidad (PBD) X 3500 mL.

TITULAR DE LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION

TITULAR:

Representaciones Agropecuarias Nacionales EIRL – REANA EIRL

NÚMERO(S) DE AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION:

Nº DE REGISTRO SENASA: F.87.33.N.0482

